

# Инструкция к применению препарата “Пеловит-Р”

## Торговое название препарата

Пеловит-Р

## Форма выпуска

Препарат для наружного применения.

Объем 500 мл. во флаконе полимерном, обеспеченным защитным колпачком из полимера. По одному флакону с инструкцией по применению в картонной коробке.

## Состав

Полностью натуральный препарат. Содержит в своем составе уникальный сложный органоминеральный комплекс биологически активных веществ, полученных из минералов лечебных грязей Куяльницкого лимана, а так же макро и - микроэлементы в естественном соотношении.

## Химический состав "Пеловит-Р"

Водородный показатель (рН) 7,72

Общая жесткость 785,0 мг-экв/дм<sup>3</sup>

Общая щелочность 5,2 мг-экв/дм<sup>3</sup>

Сухой остаток (минерализация) 157,8 г/дм<sup>3</sup>

Натрий + 60,0 г/дм<sup>3</sup>

Калий +0,9 г/дм<sup>3</sup>

Кальций 2 + 2,5 г/дм<sup>3</sup>

Магний 2 + 8,03 г/дм<sup>3</sup>

Хлор-91, 2 г/дм<sup>3</sup>

Сульфаты 2 - 2,1 г/дм<sup>3</sup>

Карбонаты 2 - 0,02 г/дм<sup>3</sup>

Бикарбонаты-0, 317 г/дм<sup>3</sup>

Еп + 289,0

## Содержание макро и - микроэлементов (мкг / г сухого вещества):

Al - 0,78 мкг / г В - 29,7 мкг / г Ва - 0,99 мкг / г Ве - 0,009 мкг / г;

Вг - 224000 мкг / г Са - 5998 мкг / г Со -0,005 мкг / г Сг - 3,79 мкг / г;

Сu - 0,51 мкг / г Fe - 23,67 мкг / г I - 3320 мкг / г К - 3697 мкг / г;

Li - 3,988 мкг / г Mg - 34250 мкг / г Mn - 2,09 мкг / г Na - 264700 мкг / г;

Ni - 2,2 мкг / г P - 21,3 мкг / г S - 9,47 мкг / г Si - 7,47 мкг / г;

Sr - 277,6 мкг / г Ti - 0,08 мкг / г Zn - 0,55 мкг / г.

## Описание

Прозрачный, бесцветный, слегка опалесцирующий раствор без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Пеловит-Р обладает мощным противовоспалительным, рассасывающим, десенсибилизирующее, биостимулирующее, обезболивающее, дренирующее, бактерицидное действие.

Пеловит-Р - иммуномодулирующий препарат, активирует процессы клеточного и гуморального иммунитета. Стимулирует регенерацию тканей, нормализует репаративные процессы и регулирует специфические реакции организма по бактериальной, вирусной и грибковой инфекции. Способствует быстрому заживлению эрозивных поражений слизистых оболочек без образования рубцов, ускоряет процесс эпителизации и устраняет катаральные явления.

## Механизм действия

Препарат Пеловит-Р обладает двух стадийном механизмом действия.

Первая стадия - обладает противовоспалительным действием, в основе которой лежит активация метаболических и энергетических процессов, что приводит к уменьшению и полной ликвидации воспалительного отека в очаге повреждения, восстановление кровообращения и восстановления подачи кислорода.

Вторая стадия - имеет биостимулирующее действие, в основе которой лежит восстановление первоначальной структуры поврежденной ткани или органа.

Эти стадии динамические, непрерывно переходят одна в другую или протекают одновременно, что приводит к восстановлению целостности органа и его нормального функционирования.

## Показания к применению

Используется в виде компрессов, примочек, обертываний, орошений, спринцеваний, полосканий, капельно, физиотерапевтических процедур, ванночек, а также биостимулирующих добавок для ванн.

## Способ применения и дозы

| Заболевания мышечной системы , соединительной ткани и опорно - двигательного аппарата                                                                                                                                                                 | Применение «Пеловит-Р»                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Травматические ушибы. В период реабилитации способствует ликвидации отека , нарушения трофики, изменения чувствительности и т.д. Активизирует процесс сращения костных переломов. Растяжение связочного аппарата. Остеохондроз позвоночника Сколиоз . | 1 способ:<br>Примочки, компрессы, обертывания. Пеловит-Р нагревают до +50 ° С (не выше) в разведении 1:1 или без разведения. Примочка накладывается на место наибольшей болезненности и тщательно укутываются на время от 30 мин. в 2:00 и более.<br>Облегчение наступает быстро и надежно. Курс 12-15 процедур. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Неврит .<br/> Радикулит .<br/> Артриты и артрозы . Последствия перенесенного ревматического артрита или полиартрита , ревматоидноидный артрит или полиартрит в неактивной фазе , микрокристаллический артрит ( подагрический артрит или полиартрит) .<br/> Болезнь Бехтерева в фазе ремиссии .<br/> Остеоартроз первичного ( полиостеароз , олигоартроз , моноартроз , спондилез , межпозвонковый остеохондроз ) и вторичного (впоследствии дисплазий , артритов , травм , статических нарушений , а также гипермобильности )<br/> Артропатии при неревматических заболеваниях (связанные с эндокринными заболеваниями - микседематозного , климактерические ) .<br/> Остеохондропатий (болезнь Петерса , Кинбека , Кенига , Келера 1 и 2 , Шермана - Мау ) .<br/> Послеоперационные контрактуры и келоидные рубцы.<br/> Операции на суставах.<br/> Последствия переломов суставов и конечностей с уменьшенной консолидацией и болезненной костной мозолью .<br/> Заболеваний мягких тканей ( миозиты , энтеропатии , включая эпикондилит , тендинит , тендовагинит , синовиты , бурситы , периартриты , мигаментиты , фасциты , апоневрозиты , включая контрактуры Дипюитрена ) .<br/> Остеомиелит хронический , гематогенный (кроме туберкулезного ) .<br/> Шпоры и подагрические узлы .<br/> Варикозное расширение вен , болезнь усталых ног</p> | <p>2 способ:<br/> Электрофорез с обоих полюсов против заинтересованного органа.<br/> Курс 12-15 процедур.<br/> 3 способ:<br/> Ванны или местные ванночки (+37-39 ° С) днем или перед сном.<br/> Добавление в ванну 0,5 л. Пеловит-Р 20-30 мин.<br/> Курс 12-15 процедур.<br/> У лиц пожилого возраста-под контролем врача ванны с t +32-36 ° С.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Заболевания ЛОР-органов:                                                                                                                                                            | Применение «Пеловит-Р»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Гайморит<br/>Ринит</p>                                                                                                                                                           | <p>Капельно в нос или промывание теплым (+37-39 ° С) раствором «Пеловит-Р» с кипяченой водой в разведении 1:3, 4-5 раз в день. На ночь закладывать турундочку смоченную разведенным теплым препаратом. Курс лечения 10-14 дней или до полного исчезновения воспалительных явлений.<br/>1-2 месяца.</p>                                                                                                                                 |
| <p>Аденоиды</p>                                                                                                                                                                     | <p>Капельно в нос и полоскания горла теплым (+37-39 ° С) раствором Пеловит-Р с кипяченой водой в разведении 1:3, 5-6 раз в день. На ночь закладывать турундочку смоченную разведенным теплым препаратом. При аденоидах курс лечения 1-2 месяца или до полного исчезновения воспалительных явлений. В результате применения препарата улучшается носовое дыхание, прекращаются выделения из носа, обостряется слух, улучшается сон.</p> |
| <p>Фарингит<br/>Ангина (острый тонзиллит): катаральная, лакунарная, фолликулярная и особенно флегмонозная на фоне медикаментозного лечения Простудные заболевания (Грипп, ОРВИ)</p> | <p>Полоскание горла теплым (+37-39 ° С) раствором Пеловит-Р с кипяченой водой в разведении 1:3, 4-5 раз в день. Курс лечения 7-10 дней или до полного исчезновения воспалительных явлений. При лечении препаратом разрушаются устойчивые вирусно-бактериальные ассоциации, снимаются явления общей интоксикации, уменьшается боль при глотании.</p>                                                                                    |
| <p>Отит. При наружных и средних отитах (катаральном, гнойном)</p>                                                                                                                   | <p>Капельно в ухо теплый (+37-39 ° С) раствор «Пеловит-Р» с кипяченой водой в разведении 1:1 по две капли в ухо 4-5 раз в день. На ночь закладывать турундочку смоченную разведенным теплым препаратом. Курс лечения 3-5 дней или до полного исчезновения воспалительных явлений.</p>                                                                                                                                                  |
| <p>Беременным при предродовой подготовки и, кормящим матерям с целью повышения</p>                                                                                                  | <p>Полоскание горла теплым (+37-39 ° С) раствором Пеловит-Р с кипяченой водой в разведении 1:3, три раза в</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                           |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| иммунитета и профилактики бактериально-вирусных инфекций. | день. На ночь закладывать турундочку смоченную разведенным теплым препаратом. Курс лечения 10 дней. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Стоматологические заболевания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Применение «Пеловит-Р»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Стоматит (афтозного, грибковом)<br/> Гингивит (воспаление десневого края)<br/> Кариес<br/> Пародонтоз<br/> Инфицирование альвеол<br/> Кандидоз полости рта и глотки<br/> К и после операционных вмешательств в стоматологии<br/> При травмах полости рта<br/> Гиперестезия зубов<br/> Зубная боль<br/> Глоссит<br/> При ношении зубных протезов</p> | <p>Полоскание полости рта раствором «Пеловит-Р» с кипяченой водой в разведении 1:3 при температуре +38-40 ° С или без разведения, в течение 30-40 секунд 5-8 раз в день. Курс лечения 1-2 недели.<br/> При необходимости курс лечения продолжить. Регулярное полоскание рта 5-8 раз в день в течение недели приводит к быстрому исчезновению отека и гиперемии десен, исчезновению афт, прекращение болевых ощущений, исчезает неприятный запах изо рта. Исчезают трудности при приеме пищи и ношении зубных протезов. В некоторых случаях к месту воспаления прикладывают смоченное Пеловит-Р марлевый тампон. Для профилактики заболеваний полости рта рекомендуется использовать Пеловит-Р 1-2 раза в день.</p> |

| Дерматологические заболевания                                                                    | Применение «Пеловит-Р»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Дерматиты.<br/> Мокнущей экземы.<br/> диатез<br/> Экзема всего тела<br/> Экзема рук и ног</p> | <p>1 способ:<br/> Примочки, компрессы, ванночки раствором «Пеловит-Р» с кипяченой водой. Начинать с разведения 1:3, постепенно повышая концентрацию до 1:1. После процедуры руки (ноги) омывают чистой водой и увлажняют кремом. Утром и вечером. Курсами по 12-15 процедур, с недельным интервалом, до полного выздоровления.<br/> 2 способ:<br/> Ванны (+36-37 ° С) перед сном на 20-30 мин.<br/> Добавление в ванну 1 л. Пеловит-Р.<br/> Кожу после ванны увлажнять кремом и</p> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | отдыхать 40-60 мин. Три ванны в неделю в течение месяца.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Псориаз                                                                             | Аналогично лечению экземы.<br>Дополнительно - УФО + грязевые аппликации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Сикоз. Фурункулы. Акне (обыкновенные угри)                                          | Компресс или примочки из разведенным, теплым Пеловит-Р на ночь.<br>Утром процедуру повторить для очищения кожи от гнойных выделений.<br>Для усиления антибактериального эффекта - на стакан Пеловит-Р добавить 5-7 капель 2% спиртовой настойки йода.<br>При обширных поражениях - ванны с добавлением 1 л. Пеловит-Р три раза в неделю.                                                           |
| Трофические язвы голени у больных с варикозным расширением вен                      | Компресс или примочки из разведенным, теплым Пеловит-Р укутывая и сохраняя тепло, 2 раза в день, утром и вечером.<br>После очистки поверхности раны и появления розовых грануляций поверхность смазать 50%-ным прополисным маслом до полной эпителизации раны.<br>В случаях глубоких повреждений кожи голени - следить за свертываемостью крови и проводить рациональную антикоагулянтную терапию. |
| Пролежни                                                                            | Компрессы, примочки, обтирания Пеловитом-Р. Начинать с разведения 1:5, постепенно повышая концентрацию до 1:1.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Грибковые поражения кожи стоп                                                       | Примочки течение трех недель, до полного отшелушивания поврежденных слоев кожи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Парезы и гемипарез<br>Состояние слабости групп мышц                                 | Постоянное обтирания кожи с целью профилактики гнойничковых повреждений кожи и сохранения активного кровообращения в заинтересованном зоне.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ожоги (1-2 степени, в т.ч. солнечные)                                               | Холодные примочки из разведенным препаратом до исчезновения болевого синдрома и покраснение. Следить, чтобы в течение всей процедуры повязка была холодной.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Себорея (повышенная секреция сальных желез кожи).<br><br>Алопеция (выпадение волос) | В только что вымытые волосы втирать теплый (+37-39 ° C) неразведенный препарат в кожу головы, сохраняя тепло, ополаскивание теплой водой через 40 мин. Курс 10 процедур через день.                                                                                                                                                                                                                |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Заболевания женской половой сферы                                                                                                                                                               | Применение «Пеловит-Р»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заболевания вульвы.                                                                                                                                                                             | Полоскание или промывания теплым (+37-39 ° C) раствором Пеловит-Р с кипяченой водой в разведении 1:3, 4 раза в день. Курс 3-5 дней или полному исчезновению воспалительных явлений.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Воспаление влагалища, шейки матки.<br>Хронический сальпингит и сальпингоофорит.<br>Хронический пара-и периметрит.<br>Эндоцервицит.<br>Хронический метрит и эндометрит.<br>Вагинальный кандидоз. | 1 способ:<br>Тампонада теплым (+37-39 ° C) раствором Пеловит-Р с кипяченой водой в разведении 1:3.<br>2 способ:<br>Спринцевание или орошения теплым (+37-39 ° C) раствором Пеловит-Р с кипяченой водой в разведении 1:3.                                                                                                                                                                                                      |
| Порушення менструальної функції.                                                                                                                                                                | 1 способ:<br>Ванны (+37-39 ° C) днем или перед сном, 20-30 мин.<br>Добавление в ванну 1,0 л. Пеловит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Воспалительные заболевания вульвы и влагалища у детей от 6 до 14 лет.                                                                                                                           | 1 способ:<br>Орошение теплым (+37-39 ° C) раствором Пеловит-Р с кипяченой водой в разведении 1:5 с помощью катетера.<br>2 способ:<br>Ванны (+37-39 ° C) днем или перед сном, 20-30 мин.<br>Добавление в ванну 1,0 л. Пеловит-Р.                                                                                                                                                                                               |
| Трещины прямой кишки.                                                                                                                                                                           | Примочки на трещину, теплым (+37-39 ° C) раствором Пеловит-Р с кипяченой водой в разведении 1:3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Хронические аднекситы, гипофункции яичников, бесплодие.                                                                                                                                         | 1 способ:<br>Орошение теплым (+37-39 ° C) раствором Пеловит-Р с кипяченой водой в разведении 1:3. Курс 12-15 процедур.<br>2 способ:<br>Электрофорез с обоих полюсов: раствор наносится на лекарственные прокладки фильтровальной бумаги, размер которых соответствует гидрофильным прокладкам электродов. Каждый день. После каждой процедуры - отдых 40 мин. В период менструаций процедуры продолжают. Курс 12-15 процедур. |
| Хронические воспалительные заболевания придатков матки.                                                                                                                                         | 1 способ:<br>Электрофорез с внутривлагалищным введением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>теплого (+37-39 ° С) раствора Пеловит-Р с кипяченой водой в разведении 1:1, в количестве 120-140 мл шприцем Жане. Электроды накладывают на крестцовую и надлобковую зоны, плотность тока 0,05-0,08 мА / см продолжительность процедуры 15-20 мин. Курс 12-15 процедур.</p> <p>2 способ:<br/>Сочетание электрофореза с вагинальным вибрационным массажем при частоте 65-68 Гц. в течение 10-15 минут. Курс 12-15 процедур.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Особые указания**

Для светловолосых и светлокожих людей (у которых повышенная чувствительность к высоким концентрациям солей) рекомендуется начинать использование в разведении 1:5, постепенно уменьшая разведения.

### **Использование в педиатрии**

Детям в возрасте от 2 до 6 лет возможно использование препарата Пеловит-Р в разведении 1:8 с теплой (+37-39 ° С) кипяченой водой. Препарат не содержит консервантов и искусственных красителей.

### **Применение при беременности и лактации**

Возможно применение препарата Пеловит-Р при беременности и в период лактации.

### **Противопоказания**

Не использовать в местах локализации злокачественных опухолей.

### **Побочные действия**

Побочных действий препарата не выявлено.

### **Передозировка**

Случаи передозировки не отмечены.

### **Срок годности**

12 месяцев. Допускается наличие небольшого количества нерастворимого осадка, который является химически инертным и не влияет на свойства препарата.

### **Условия хранения**

Препарат рекомендуется хранить в недоступном для детей месте при температуре от +4-25 ° С. Содержание раскрытого флакона можно использовать в течение всего срока годности.

### **Условия отпуска из аптек**



Без рецепта. Не является лекарственным средством.

Производитель ООО «АКСИМЕД» Украина [www.aximed.com.ua](http://www.aximed.com.ua)

Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы №  
05.03.02-04/106223. От 29.12.2010 г.